

PULVEX® Spot

Insecticide et acaricide pour chiens

Composition

Solution cutanée pour dépôt (spot-on) :

PERMETHRINE 715 mg

Excipient q.s.p. 1 dose de 1 ml

Propriétés

PULVEX® *Spot* est une solution concentrée de perméthrine, prête à l'emploi, limpide, légèrement ambrée, pour usage local externe. Elle est destinée à être appliquée selon la technique du "pour-on".

L'originalité de cette solution réside dans l'association de la perméthrine avec un excipient spécifique qui agit à la fois comme solvant et comme véhicule du principe actif. Il a été développé spécialement pour assurer la diffusion externe et la répartition de la perméthrine sur le chien tout entier.

- Diffusion externe et rémanence : déposé en un point ou deux (une ou deux doses selon le poids du chien), PULVEX® *Spot* diffuse rapidement à la surface de l'animal. Dans les heures qui suivent, le corps est entièrement recouvert d'un écran protecteur de perméthrine. Des études ont montré la migration de la perméthrine sur l'ensemble de la surface corporelle après application de PULVEX® *Spot* selon le mode d'emploi recommandé. Les résultats indiquent que cette application permet d'obtenir une répartition homogène et persistante de la perméthrine sur le poil des chiens traités, au cours des 4 semaines suivant le traitement.

- Efficacité : PULVEX® *Spot* est un insecticide et acaricide d'action curative et préventive. Les essais cliniques sur le chien démontrent l'efficacité contre les puces (en particulier sur *Ctenocephalides canis* et *felis*) et contre les tiques (en particulier sur les genres *Rhipicephalus*, *Dermacentor* et *Ixodes*). Une étude américaine récente a révélé également l'intérêt de son utilisation dans le contrôle des moustiques (*Aedes aegypti*) chez le chien.

Dès son application, PULVEX® *Spot* commence à agir au contact des parasites et élimine rapidement les puces et les tiques (action

curative). Sa rémanence de 4 semaines permet de prévenir les réinfestations par les puces et les tiques (action préventive). L'efficacité est maintenue après immersion ou baignade de courte durée.

PULVEX® *Spot* agit par "effet de surface" (non systémique) : les puces et les tiques n'ont pas besoin de piquer pour être tuées, ce qui est essentiel dans le traitement de la DAPP.

- Tolérance : PULVEX® *Spot* présente une excellente tolérance locale et générale, et son mode d'action non systémique renforce sa sécurité d'emploi chez le chien.

Indication

Chez les chiens : traitement préventif et curatif des infestations par les tiques et les puces.

Administration et posologie

Usage externe. Application cutanée.

Pour toute application, écarter les poils jusqu'à ce que la peau soit visible et vider la dosette (soit une dose de 1 ml), en un point, directement sur la peau.

- *Chiens pesant de 1 à 15 kg* : une dose sur le dos entre les épaules.

- *Chiens pesant plus de 15 kg* : 2 doses, une sur le dos entre les épaules et une deuxième à la base de la queue.

- Répétition des traitements : l'intervalle entre deux traitements dépend de la sévérité de la pression parasitaire. Pour assurer une protection durable contre les tiques et les puces, il est recommandé de renouveler l'application tous les mois et de traiter simultanément l'environnement domestique avec un produit antiparasitaire.

L'intervalle entre deux traitements ne doit jamais être inférieur à 7 jours.

En fonction de la nature du poil, une tache peut être visible autour du point d'application. Ceci est normal, et traduit la bonne diffusion du produit.

- Pour une efficacité optimale, il est recommandé de :

- Ne pas masser la peau après application,
- Eviter de déposer le produit sur les poils,
- Ne pas toucher la zone d'application dans les 6 heures qui suivent le traitement,
- Traiter le soir de préférence.

Contre-indications

Contre-indication absolue :

Ne pas utiliser chez le chat.

Effets indésirables

Quelques rares signes de réaction cutanée locale (érythème, prurit), toujours transitoires et spontanément réversibles, peuvent être observés au point d'application. En cas d'apparition de signes de sensibilité au produit, il est recommandé d'arrêter le traitement et de laver l'animal.

Précautions

- Eviter tout contact avec la peau. Se laver les mains après usage. Eviter tout contact avec les yeux et rincer abondamment toute éclaboussure avec de l'eau.
- Dangereux pour les poissons et les crustacés. Ne pas contaminer les aquariums, les bassins. Prendre les précautions d'usage en jetant les conditionnements vides.
- Ne pas utiliser sur les chiots de moins de 2 semaines.

Catégorie

Médicament à usage vétérinaire.

Conservation

Tenir à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Présentations

Carte de 6 applicateurs détachables de 1 flacon de 1 ml

A.M.M. 672 895.5 du 23/08/93

SCHERING-PLOUGH Vétérinaire

92, rue Baudin

92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Tél. : 01.41.06.35.00

Fax : 01.41.06.35.09